Hydrobiologia **298**: 355–360, 1995.
D. Belk, H. J. Dumont & G. Maier (eds.), Studies on Large Branchiopod Biology and Aquaculture II.

INDEX

agro-industrial wastes, 167
algal density, 162
Algeria, 183, 281
androdioecy, 54
aquaculture, 167
Argentina, 239
Artemia, 9, 241, 264, 295
A. franciscana, 317
A. gracilis, 317
A. monica, 317
A. parthenogenetica, 183, 287, 264, 317
A. salina, 264, 317
A. sinica, 317
A. sp., 287
A. tunisiana, 264, 317
A. urmiana, 318
Artemiopsis, 265
A. bungei , 318
A. bungei plovmornini, 265, 318
A. stefanssoni, 318

ß-carotene, 133, 141
bain's vlei, 95
baker's yeast, 141
Branchinecta, 264
B. achalensis, 318
B. belki, 318
B. campestris, 318
B. cervantesi, 320
B. coloradensis, 318
B. conservatio, 319
B. cornigera, 319
B. dissimilis, 319
B. ferox, 264, 319
B. gaini, 319
B. gigas, 319
B. granulosa, 239, 319
B. iheringi, 319
B. leonensis, 319
B. lindahli, 141, 152, 179, 320
B. longiantenna, 320
B. lynchi, 320
B. mackini, 320
B. mexicana, 320
B. minuta, 264, 320
B. orientalis, 264, 287, 320
B. paludosa, 264, 321
B. paludosa tjanshanica, 321
B. palustris, 321
B. papillosa, 321
B. pollicefera, 321
B. potassa, 321
B. prima, 321
B. rocaensis, 322
B. sandiegonensis, 322
B. santacrucensis, 239
B. skorikowi, 322
B. somuncurensis, 322
B. tarensis, 322
B. tolli, 264, 322
B. valchetana, 322
B. vuriloche, 322
Branchinectella, 265
B. media, 265, 323
Branchinella, 264
B. acacioidea, 323
B. affinis, 323
B. achua, 323
B. apophysata, 323
B. arborea, 323
B. australiensis, 323
B. basispina, 323
B. buchananensis, 323
B. compacta, 324
B. denticulata, 324
B. dubia, 324
B. frondosa, 324
B. hardingi, 287, 324
B. hattahensis, 324
B. kugenumaensis, 212, 287, 324
B. latzi, 325
B. lihaca, 325
B. longirostris, 325
B. lyrifera, 325
B. minuta, 325
B. mira, 325
B. nicholsi, 325
B. occidentalis, 325
B. ondonguae, 325
B. ornata, 287, 325
B. pinnata, 326
B. proboscida, 326
B. simplex, 326
B. spinosa, 183, 188, 264
B. sublettei, 326
B. wellardi, 326
B. yunnanensis, 326

Branchiodopsis
B. abiadi, 326
B. acanthopenes, 287, 327
B. affinis, 287, 327
B. browni, 327
B. candea, 327
B. drepane, 327
B. hodgsoni, 327
B. kalaharensis, 327
B. kaokoensis, 327
B. karroensis, 327
B. natalensis, 328
B. scambus, 328
B. simplex, 328
B. terpogossiani, 328
B. tridens, 103, 328
B. wolfi, 328
Branchipus, 264
B. blanchardi, 264, 328
B. cortesi, 264, 328
B. intermedius, 264, 328
B. laevicornis, 328
B. passai, 329
B. schaefferi, 105, 183, 186, 264, 287, 329
B. visnyai, 264, 329
Brancinella chudeaui, 324
Bredocaris, 12
Briarosaccus tenellus, 4

Caribbean coast, 253
Caspian sea, 263
Chaoborus sp., 109
checklist, 315
Chirocephalus, 264
C. appendicularis, 329
C. bairdi, 329
C. bobrinskii, 329
C. brevipalpis, 233, 264, 329
C. carnuntanus, 264, 330
C. chyzeri, 264, 330
C. croaticus, 264, 330
C. diaphanus, 183, 187, 200, 233, 265, 330
C. diaphanus carinatus, 234, 312, 265, 330
C. diaphanus pentheri, 234
C. diaphanus romanicus, 330
C. diaphanus romanticus, 265
C. diaphanus salinus, 234
C. festae, 330
C. hardingi, 330
C. horribilis, 265, 330
C. jaxartensis, 331
C. josephinae, 265, 331
C. kerkyrensis, 265, 331
C. longicornis, 331
C. ludmilae, 331
C. marchesonii, 265, 331
C. mongolianus, 331
C. nankinensis, 331
C. neumanni, 331
C. orghidani, 265, 332
C. paphlagonicus, 332
C. pelagonicus, 265, 312, 332
C. povolnyi, 332
C. priscus, 287, 332
C. recticornis, 332
C. reiseri, 265, 332
C. ripophilus, 265, 332
C. robustus, 265, 332
C. ruffoi, 265, 333
C. salinus, 265, 333
C. shadini, 265, 333
C. sibyllae, 265, 333
C. sinensis, 333
C. skorikowi, 333
C. slovacicus, 265, 333
C. spinicaudatus, 265, 333
C. tauricus, 333
C. tereki, 334
C. turkestanicus, 334
C. vornatscheri, 334
C. vornatscheri bulgaricus, 265, 334
C. wangi, 334
C. weisigi, 334
cladistic analysis, 15
cladistics, 42
cladogram, 41
Colombia, 113, 125, 253
color patterns, 133, 135
conductivity, 163
culture medium, 159

cumulative survival, 154
Cyclestheria, 113
C. hislopi, 126, 254, 48
Cyclestheridiidae, 254
cyst hatching, 175
Cyzicus, 265, 45
C. buchetti, 265
C. grubei, 265
C. gynecia, 49, 58
C. tetracerus, 265

Daphnia ulomskyi, 313
Dendrocephalus, 131
D. affinis, 334
D. argentinus, 334
D. brasiliensis, 334
D. cervicornis, 335
D. cornutus, 335
D. geayi, 335
D. sarmentosus, 335
D. spartaenovae, 335
D. venezolanus, 335
Dexteria floridana, 335
dmso, 175
Drepanosurus, 265
D. birostratus, 265
D. hankoi, 265
D. vladimiri, 265
Dunaliella sp, 296

encystment, 295
Eocyzicus, 266
E. concavus, 53
E. orientalis, 266
E. propinquus, 266
E. skorikowi, 266
E. tadei, 266
Eoleptestheria, 266
E. ticinensis, 266
Eubranchipus, 241
E. (D.) birostratus, 242, 335
E. (D.) claviger, 336
E. (D.) hankoi, 336
E. (D.) rostratus, 337
E. (D.) uchidai, 337
E. (D.) vladimiri, 337
E. bundyi, 335
E. grubii, 242, 336
E. holmanii, 336
E. intricatus, 336
E. moorei, 336
E. neglectus, 336
E. oregonus, 337
E. ornatus, 337
E. serratus, 337
E. vernalis, 242, 337
Eulimnadia cf. geayi, 125
E. colombiensis, 125, 254
E. magdalenensis, 125, 254
E. texana, 67, 83, 73
Europe, 263, 281

fecundity, 169
female genital tract, 216
flow-through culture system, 146

Germany, 105
glycerol, 175
growth, 169

hatching, 179
historical biogeography, 281

Imnadia, 266
I. yeyetta, 266, 313
India, 287
intrasexual selection, 68
inundation, 93

Jebel Uweinat, 282

larval development,1
larviculture, 159
Laurasia, 241

Lepidurus, 265
L. apus, 265
L. apus lubbocki, 265
L. arcticus, 265
L. couesii, 265
Leptestheria, 125, 249, 254, 266, 45, 52
L. dahalacencis, 266
L. mayeti, 266
L. saetosa, 245
Leptestheriidae, 254
Leptesherinella inermis, 103
life cycle, 113
life history, 295
life-history strategies, 93
light, 175
limb structure, 183
limbs, 3
Limnadia, 266
L. lenticularis, 266
L. orinoquiensis, 125, 254
Limnadiidae, 254
Linderiella, 264
L. africana, 337
L. massaliensis, 264, 338
L. occidentalis, 338
Lynceidae, 254
Lynceus, 125, 266
L. aequatorialis, 254
L. andronachensis, 266
L. brachyurus, 266

Macedonia, 307
Maghrebestheria, 52
male antenna, 209
male cercopods, 214
male genitalia, 213
male-male competition, 67
mandible, 5
mating behavior, 73
Mauretania, 90, 281
Metabranchipus patrizii, 338
Metalimnadiidae, 254
Metalimnadia serratura, 254
Morocco, 281
mortality, 169

Niger, 281
Nile valley, 282
Nomina dubia, 315
Nomina nuda, 315

Orsten formation, 1
outcrossing, 80

Pakistan, 287
pans, 93
Paralimnetis, 125
P. mapimi, 254
P. rapax, 254
Parartemia
P. contracta, 338
P. cylindrifera, 338
P. extracta, 338
P. informis, 338
P. longicaudata, 338
P. minuta, 338
P. serventyi, 339
P. zietziana, 339
parthenogenesis, 56
parthenogenetic cycle, 114
Phallocryptus wrighti, 339
phototaxis, 87
phylogeny, 15, 40, 203, 51
Polyartemia forcipata, 339
Polyartemiella
P. hazeni, 339
P. judayi, 339
P. forcipata, 264

Rehbachiella kinnekullensis, 1
resting eggs, 295

Sahara, 282
Saudi-arabia, 281
seasonal cycle, 105
selfing, 83
setation pattern, 183
Sewelletheria, 52

sex determination, 45
sex ratio variation, 47, 75
sexual cycle, 115
sexual dimorphism, 2
sexual selection, 67
Siphonophanes, 265
S. grubii, 265
Slovakia, 283
South Africa, 93
Spain, 282
species richness, 287
Sri Lanka, 287
starvation resistance, 105
Streptocephalidae, 15, 203, 216
Streptocephalus, 15, 203, 216, 264
S. annanarivensis, 339
S. antillensis, 223, 27, 339
S. areva, 339
S. bidentatus, 220, 340
S. binaris, 340
S. bourquinii, 220, 340
S. bouvieri, 219, 340
S. cafer, 221, 340, 302
S. cirratus, 222, 340
S. cladophorus, 222, 340
S. coomansi, 221, 340
S. dendrophorus, 222, 340
S. dendyi, 218, 340
S. dichotomus, 204, 221, 287, 341
S. distinctus, 220, 341
S. dorothae, 27, 224, 341
S. dregei, 341
S. echinus, 222, 287, 341
S. gauthieri, 219, 341
S. gracilis, 222, 341
S. guzmani, 22, 341
S. indistinctus, 221, 341
S. jakubskii, 342
S. javanensis, 219, 342
S. kaokoensis, 219, 342
S. kargesi, 17, 218, 342
S. lamellifer, 219, 342
S. linderi, 224, 30, 342
S. longimanus, 222, 287, 342
S. mackini, 15, 32, 224, 342
S. macrourus, 103, 220, 343
S. mattoxi, 25, 343
S. moorei, 224, 33, 343
S. namibiensis, 222, 343
S. ovamboensis, 223, 343, 203
S. papillatus, 222, 343
S. potosinensis, 34, 343
S. proboscideus, 87, 159, 167, 223, 204,
S. propinquus, 343
S. purcelli, 219, 344
S. rotschildi, 219, 344, 219
S. rubricaudatus, 183, 185, 203, 223, 282, 344
S. rugosus, 344
S. sealii, 17, 220, 344
S. similis, 20, 221, 344, 203
S. simplex, 287, 344
S. spinicaudatus, 222, 344
S. spinifer, 219, 287, 345
S. spinosus, 221, 345
S. sudanicus, 220, 345
S. texanus, 224, 345, 37, 203
S. torvicornis, 90, 183, 184, 203, 216, 223, 264, 281, 345
S. torvicornis braueri, 264
S. torvicornis bucheti, 264
S. trifidus, 221, 345
S. vitreus, 220, 345
S. woottoni, 22, 221, 345
S. zeltneri, 346
S. zuluensis, 346
succession, 295

Tanymastigites
T. brteki, 346
T. cyrenaica, 346
T. jbiletica, 346
T. mzabica, 346
T. perrieri, 183, 189, 346
Tanymastix, 307
T. affinis, 346
T. lacunae, 264
T. motasi, 308, 346, 264
T. stagnalis, 307, 346, 264
T. stellae, 347, 264

temperature, 179
temporary water, 93
Thamnocephalus
T. mexicanus, 347
T. platyurus, 133, 141, 151, 175, 179, 347
T. venezuelensis, 347
Tibesti mountains, 281
Triops, 265
T. cancriformis, 265, 313
T. cancriformis mauritanicus, 265
T. cancriformis simplex, 265
T. granarius, 103
T. numidicus, 265
Triturus alpestris, 109

unisexuality, 45, 54
upper cambrian, 1
Ural river, 263

vertical migration, 87

water quality, 163, 167, 170
Würm III-glaciation, 281

Yemen, 281
Yugoslavia, 233, 245

zoogeography, 287, 307
zooplankton, 295